

COLÉOPTÈRES DE L'AFRIQUE INTERTROPICALE  
ET AUSTRALE,

par L. Fairmaire.

## DEUXIÈME NOTE.

**Lebistina subcruciata.** — Long. 9 mill. — *Ovata, postice ampliata, modice convexa, vix nitidula, rufa, elytris magis flavis, macula scutellari subquadrata et plaga magna transversa post medium, margines fere attingente, cum præcedenti per suturam conjuncta, margine postico sat fortiter sinuato, macula oblonga humerali. antennis (articulo 1<sup>o</sup> exep<sup>to</sup>), genubus, tibiis, tarsisque nigris; capite dense punctulato, inter antennis transversim impressiusculo, palpis nigris; prothorace transverso, brevi, lateribus rotundato, dorso dense subtiliter punctato, leviter rugosulo, medio subtiliter striato, lateribus postice sat late explanatis, elevatis, margine postico utrinque obliquato, angulis posticis acute rectis; scutello acute ogivali, punctulato, elytris sat amplis, apice late truncatulis, dorso subtiliter striatis, striis lævibus, intercallis planis, sat dense punctatis; subtus fere lævis, femoribus sat validis, tibiis sulcatulis.* — Afrique australe (D<sup>r</sup> Schinz, ma collection).

Le dessin des élytres et la taille de cette espèce la rendent facile à reconnaître. Elle ressemble assez à certains *Brachinus*.

**Teffus tenuicollis.** — Long. 40 mill. — *Elongatus, sat convexus, niger, nitidus; capite lævi, inter antennis fortiter biimpresso, clypeo recte truncato, foreolis brevibus profunde biimpresso, labro lato, punctis 4 grossis profunde impresso; prothorace subovato, postice paulo magis quam antice angustato, lateribus medio obtusissime subangulato, dorso medio sulcato et transversim plicatulo, antice sparsum punctato, lateribus depresso, rugosulo-punctato, basi utrinque impresso, angulis fere rotundatis; elytris ovato-oblongis, basi angustatis, sutura et utrinque costis 7 elevatis, politis, 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> et 7<sup>a</sup> basi abbreviatis; subtus lævis, abdomine lateribus impressiusculo, segmentis apice haud punctis impressis, segmento anali apice punctis grossis impresso, pedibus sat magnis.* — Haut Congo (ma collection).

Ce *Teffus* se distingue par sa forme allongée, son corselet étroit et ses segments ventraux dépourvus de gros points vers le bord apical. Il se rapproche du *T. Delegorguei*, mais le corselet

est encore plus étroit, surtout vers la base, le disque n'est pas rugueux, mais plissé transversalement, avec un sillon médian assez profond, les bords latéraux sont déprimés, encore plus que chez le *Zanzibaricus*; sur les élytres les intervalles des côtes sont sculptés comme chez le *Delegorguei*. Le labre est bien plus court, uni et marqué de 4 gros points.

**Heteronychus lævilineatus.** — Long. 15 mill. — *H. punctolineato simillimus sed paulo minor et præsertim gracilior, vertice haud impresso, prothorace angustiore, antice minus angustato, elytris similiter tenue striatis striis lævibus, basi levissime punctulatis.* — Mozambique (ma collection).

Ressemble extrêmement à l'*H. punctolineatus*, de Cochinchine, mais plus étroit, avec le corselet bien moins rétréci en avant et les élytres à stries très fines, lisses, n'ayant que quelques points à la base; l'appareil stridulant du propygidium est très peu marqué, tandis qu'il est bien marqué chez le *punctolineatus*.

Cette espèce paraît se rapprocher de l'*H. atratus* Kl., de Mozambique, mais ce dernier n'a que 13 mill., les élytres ont des rangées de points enfoncés, les 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> oblitérées en arrière et ne dépassant guère le milieu des élytres, les intervalles sont lisses, les 2<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> portent seulement quelques points peu marqués; le pygidium est rebordé et ridé sauf l'extrémité qui est lisse.

**Heteronychus curtipennis.** — Long. 18 mill. — *Ovatus, postice leviter ampliatus, convexus, fusco-niger, parum nitidus; capite punctulato, antice angustato, margine antico truncatulo, paulo reflexo, fronte æquali, palpis antennisque piccolo-rufis; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice angustato, lateribus a basi leviter arcuatis, anguste marginatis, dorso punctulato, basi fere recta, marginata, angulis rectis, apice obtusis; scutello triangulari, lævi, elytris brevibus, prothorace vix dorso longioribus, apice truncatis, sed extus rotundatis, dorso fortiter, crenulato-striatis, intervallis convexiusculis, latitudine paulo inæqualibus, lævibus; pygidio brevi, punctato, medio foveola signato; subtus cum pedibus nitidior, piceus, fere lævis; pedibus sat validis, tibiis anticis obtuse tridentatis, tarsis anticis articulo 5<sup>e</sup> elongato, crasso, unguibus valde inæqualibus.* — Mozambique (ma collection).

Cet *Heteronychus* se distingue par sa forme courte, ses élytres tronquées, à peine deux fois aussi longues que le corselet, ce qui le rapproche du *minutus*; mais ce dernier est bien plus petit, les élytres ne sont pas striées, le corselet n'est pas ponctué et le chaperon est un peu bidenté.

**Oryctes truncaticollis.** — Long. 40 mill. — *Ovatus, valde convexus, crassus, postice haud sensim ampliatus, fusco-castaneus,*

*valde nitidus; capite lateribus rugoso et ampliato, clypeo antice obtuso, cornu valido, compresso, lævi, arcuato, apice breviter recurvo armato; prothorace brevi, elytris haud angustiore, antice late oblique truncato, truncatura dense coriaceo-granulata et rufo-villosa, carina supera late arcuato-emarginata, medio utrinque obtusissime angulata, angulis lateralibus compressis, angulatim productis, parte supera lævi, utrinque, impressiuscula, basi valde bisinuato et sulco rugoso sat lato comitata; scutello rugosulo-punctato, elytris ad humeros angulatis, ad suturam lævibus, stria suturali profunda, disco et extus geminatim lineato-punctatis, intervallis medio subrugosis; propygidio dense rufo-villoso, pygidio lævi, valde convexo; pectore rugosulo-punctato, rufo-villoso, abdomine fere lævi, pedibus sat validis, tibiis anticis valde tridentatis, posterioribus apice sat acute quadridentatis. — Gabon (coll. Léseleuc).*

Cet *Oryctes* s'éloigne de ses congénères par la troncature du corselet qui en prend toute la largeur, le bord supérieur formant un croissant dont le milieu est plus fortement arrondi, et les angles latéraux formant une large oreillette angulée; cette troncature presque verticale est couverte d'une granulation déprimée très serrée et d'une villosité rousse également serrée.

***Oryctes cratericollis.*** — Long. 48 mill. — *Oratus, valde convexus, crassus, postice leviter ampliatus, fuscus, nitidus; capite triangulari, apice obtuso et dente conico brevi armato, lateribus vix sensim angulato. elevato, fronte postice tuberculo conico brevissimo signata; prothorace basi elytris parum, antice haud angustiore, lateribus rotundatis, basi breviter sinuatis, angulis sat acutis, dorso transverso, medio late ac profunde excavato a basi usque ad apicem, margine antico medio dente conico brevissimo notato, lateribus antice valde elevatis, dentem fere verticalem, apice obtuso, levissime intus arcuatum et lævem efficientibus, dorso undique punctis grossis modice profundis, interdum cicatricosis et ocellatis impresso; scutello dense punctato, apice lævi; elytris ad humeros sat angulatis, dorso dense punctato-rugosis, punctis ocellatis, lineis geminatis vix distinguendis, stria suturali basi et apice impressa; propygidio dense subtiliter strigosulo-punctato, pygidio lato, brevi, densissime ruguloso-punctato, apice dense rufo-ciliato; pectore dense punctato-ruguloso et rufo-villoso, abdomine lævi, segmentis basi punctatis, ultimo rugoso-punctato; pedibus validis, tibiis anticis quadridentatis, posterioribus apice extus rotundatis, intus calcaribus 2 validis laminatis terminatis. — Guinée (ma collection).*

Insecte remarquable par la grande cavité qui occupe tout le disque du corselet jusqu'au bord postérieur, et dont les côtés sont

relevés en cornes droites, épaisses; les élytres présentent une sculpture formée de points ocellés serrés, avec les intervalles un peu ruguleux, et qui ne permet guère de distinguer les lignes géminées.

**Agenius** (*Stringophorus*) **monochrous**. — Long. 20 mill. — *Niger, nitidus; capite sat grosse parum dense punctato, antice paulo minus, clypeo antice late sat profunde sinuato, angulis productis, antennis fuscis; prothorace elytris angustiore, transverso, hexagono, antice et postice, æqualiter angustato, dorso sat fortiter laxè punctato, lateribus fulvo-ciliatis, medio obtuse angulatis, basi fere recta; scutello apice obtuso, punctis raris impresso; elytris ad humeros late rotundatis, medio leviter ampliatis, apice separatim rotundatis, dorso sat fortiter striatis, intervallis convexis, alternatim paulo magis elevatis, 2<sup>e</sup> dense punctato, rugosulo, 4<sup>e</sup> parce punctato, apice rugosulis; pygidio subtilissime transversim strigosulo; subtus cum femoribus grosse parum dense punctatis, tibiis sulcatis, anticis extus dentibus 2 parum validis sat acutis.* — Zanzibar (ma collection).

Très voisin du *morulus* Jans., d'Old-Calabar, en diffère par la tête dépourvue de 3 impressions, les antennes et les palpes d'un brun noirâtre, à ponctuation forte, égale, peu serrée, les angles postérieurs arrondis, l'écusson à peine ponctué, le pygidium sans fossettes à la base et le dessous du corps ponctué assez fortement.

**Paratænia aurosovirens**. — Long. 25 mill. — *Elongata, postice attenuata, aurosa, metallica, capite prothoraceque auroso-viridibus, late cyaneo vittatis, elytris basi leviter et post medium ad suturam viridi tinctis, extus ante apicem cærulescenti marginatis; capite punctato-rugoso, medio sulcato, antice bifoveato; prothorace transverso, trapeziformi, elytris parum angustiore, antice attenuato, rugoso-punctato, medio et lateribus longitudinaliter leviter impresso; scutello truncato, sulcatulo; elytris elongatis, fere a basi postice attenuatis, humeris oblique truncatis et extus obtuse angulatis, dorso fortiter punctato-striatis, intervallis punctatis, alternatim paulo convexis, sed basi planatis, 5<sup>e</sup>-5<sup>o</sup>que postice costulatis ante apicem plaga impressa aurulenta interruptis, parte laterali magis punctata, rugosula, costa submarginali sat elevata, margine postico acute denticulato; subtus æneo-aurosa, sat dense punctata, segmentis ventralibus medio lævigatis, apice obscure cæruleis, ultimo rugosulo-punctato, medio carinulato.* — Gabon.

Ressemble beaucoup à l'*orbicularis* Kerrem., mais plus grand, avec la tête plus sculptée, ayant 2 fortes impressions au bord antérieur, le corselet plus large, les élytres plus larges à la base, les épaules coupées obliquement, formant en dehors un angle



obtus, les intervalles des stries plus ponctués, le dessous du corps plus fortement ponctué et le dernier segment ventral moins atténué vers l'extrémité qui est plus rugueuse, plus largement tronquée.

**Psiloptera dicercoïdes** — Long. 19 mill. — *Oblonga, postice leviter attenuata, modice convexa, capite prothoraceque cœruleo-anescentibus, elytris magis cœruleis, punctis et impressionibus auroso-cupreolis, his margine laterali sat late aureo-cupreolo, subtus cum pedibus paulo magis anescens, indumento cupreolo vestita, tarsis viridi-aeneis; capite carioso, sat æquali, antennis aeneis, serratis, prothoracis medium haud superantibus; prothorace parum transverso, a medio antice attenuato, punctato-rugoso, disco medio longitudinaliter impresso, impressionis lateribus leviter incrassatis, utrinque paulo post medium plagula subrotundata signato, postice utrinque vittula irregulari subelevata; scutello transverso, impresso, lateribus rotundato; elytris oblongis, post medium angustatis, apice paulo oblique truncatis et utrinque angulatis, dorso grosse substriato-punctatis, intervallis convexis, angustis, a striis crenatis, paulo rugosulis, parce punctatis, maculis minutis cupreolis sparsutis, vitta marginali paulo depressa, margine ipse ante medium obtusissime angulato; subtus cum pedibus sat dense punctata, rugosula, prosterno utrinque profunde sulcato, abdomine basi bicarinato, lateribus plagulis chalybeis sparsuto, ultimo medio leviter sulcatulo.* — Gabon (coll. Kerremans).

Le faciès de cet insecte rappelle celui des *Dicerca*, mais c'est une simple apparence, car il appartient bien au genre *Psiloptera*, et se rapproche assez du *P. æneomaculata*, de Madagascar. Il en diffère par le corps plus étroit, plus convexe, plus atténué vers l'extrémité qui est plus tronquée, par le corselet sans bordure marginale déprimée, plus large à la base, et par les élytres à interstries sans impressions, avec une bordure marginale plus large, plus régulière.

**Pseudagrilus densegranatus**. — Long. 7 mill. — *Oblongus, crassus, obscure viridi-metallescens, parum nitidus; supra dense granulosus; capite sat magno, medio late impresso, antennis brevibus, obscure cupreis; prothorace transverso, postice elytris fere latiore, antice a medio angustato, dorso medio sat convexo, lateribus depressiusculo, basi medio late lobato-truncato, angulis posticis fere rectis; scutello lavi, triangulari, apice acutissimo; elytris oblongis, post medium ampliatis, apice obtuse rotundatis, sutura et utrinque costa discoidali sat elevatis, costula intermedia parum distincta, medio oblitterata et costula marginali vix distincta; subtus cum pedibus cupreolis, nitidior, dense subtiliter punctulato-coriaceus, pedibus magis cupreolis.* — Couango (coll. Kerremans).

Facile à reconnaître par sa sculpture densément granuleuse sur laquelle se détachent les côtes des élytres. Ressemble au *Melibæus carinatus* Qued., mais plus petit avec les côtes des élytres concolores au lieu d'être noires.

**Monomma senegalense.** — Long. 5 mill. — *Ovatum, postice attenuatum, fere cuneiforme, piceo-fuscum, nitidum, subtilissime pallido-setosulum; capite subtiliter dense punctato, antice rufescente, oculis valde approximatis, antennis piceis, basi rufescentibus; prothorace transverso, antice arcuatim angustato, dorso densissime punctato, basin versus subtiliter strigosulo, basi medio obtuse angulato; scutello obtuse triangulari; elytris a basi attenuatis, subtilissime striatulis, intercallis planis, dense subtiliter punctulato-asperulis; subtus magis piceus, abdomine dilutiore, pectore medio subtiliter punctato, lateribus asperulo, abdomine subtiliter asperulo-punctato, segmento ultimo bilunulato, pedibus rufo-piceis.* — Sénégal, Rufisque, communiqué par M. Tournier.

C'est, je crois, la seconde espèce signalée dans une région aussi occidentale. Elle se distingue par sa forme ovalaire, atténuée en arrière, presque cunéiforme. Elle se rapproche de *l'atrovirens* Fairm., d'Abyssinie, mais elle est plus petite, plus atténuée en arrière, le corselet est plus large, les élytres ont des stries à peine marquées avec les intervalles plans, et les yeux sont très rapprochés. L'autre espèce sénégalienne est le *M. Auberti* R. Oberth., Coleopt. Novit., 40; elle a 6 mill., elle est noire, avec le corselet finement pointillé, les angles antérieurs prolongés de part et d'autre en avant et arrondis, les élytres ayant 20 séries de points assez fins, séparées par des intervalles un peu squamuleux, flexueuses sur les côtés, derrière les épaules, et le dernier segment de l'abdomen pourvu d'une seule lunule.

**Laius inflaticornis.** — Long. 3 mill. — *Oblongus, postice ampliatus, convexus, violaceus, nitidus, sat longe hirtulus; capite brevi, cum oculis prothorace latiore, subtiliter punctato, fronte et clypeo impressis; antennis medium corporis haud attingentibus. fuscis, articulis 5 primis rufo-testaceis, 2° et 5° latis, inflatis, 1° supra levissime obscurato, palpis fuscis; prothorace transverso, medio elytris haud angustiore, sed postice valde angustato et utrinque obtuse angulato, antice leviter attenuato, basi transversim fortiter impresso, margine postico elevato, angulis valde obtusis; scutello fusco, subopaco; elytris purpurinis, medio paulo violaceo tinctis, grosse ac dense punctatis, sutura anguste paulo elevata; subtus obscure xneo-cærulescens, pedibus fuscis, femoribus paulo ænescentibus.* — Haut-Congo (ma collection).

Cette jolie petite espèce est remarquable par sa coloration, et par les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> articles des antennes épaissis.

## ACANTHIOIDES n. g.

Ce nouveau genre, voisin des *Lycanthropa*, en diffère au premier coup d'œil par le corps plus convexe, à peine déprimé sur les côtés, et surtout par le corselet dont les côtés sont fortement arrondis, les angles postérieurs rentrants, très obtus; le bord antérieur est largement, mais faiblement échancré, avec les angles très peu saillants; la sculpture est aussi fort différente, composée de fines granulations; les élytres paraissent soudées, les pattes sont courtes et robustes.

**A. asperula.** — Long. 6 mill. — *Brevissime ovata, suborbicularis, parum convexa, fusca, subopaca, brevissime ferrugineo-setulosa; capite asperulo-punctato, sutura clypeali impressa, clypeo transverso, truncato, lateribus dilatato; prothorace longitudine duplo latiore, antice angustiore, lateribus valde rotundato, disco ad latera carinula tenui arcuata signato, margine postico utrinque sinuato, angulis anticis paulo productis; elytris brevibus, orbiculatis, extus et ad humeros rotundatis, margine externo interdum subtiliter laxè granato; subtus cum pedibus cinereo-lutoso pilosula.* — Mozambique (ma collection).

**Distretus inæqualis.** — Long. 14 mill. — *Oratus, elytris parum convexis, acute marginatis, fusco-fuliginosus, opacus; capite rugoso-asperulo, transversim leviter biimpresso; antennis parum gracilibus, prothoracis basin longe superantibus, apice levissime compressis, articulis 2 ultimis brevioribus; prothorace fere gibboso-convexo, longitudine haud latiore, lateribus sat fortiter rotundato, dorso dense aspero-granulato, intervallis punctatis, punctis setigeris, linea dorsali subtiliter indicata, utrinque leviter impresso, angulis anticis sat fortiter productis, posticis obtusis; scutello indistincto; elytris brevissime ovatis, dense parum fortiter punctatis, punctis setula brevi minutis, postice fortiter declivibus, costa externa acuta, vix undulata, dorso utrinque seriebus 5 undulatis aut interruptis leviter tuberculosus, serie 1<sup>a</sup> præsertim antice fere obsoleta, parte laterali lata, paulo inæquali, parce punctulata, medio longitudinaliter paulo elevata, epipleuris sat latis, ad apicem prolongatis; subtus nitidus, pectore sat fortiter parum dense punctato, abdomine subtiliter punctulato, segmento ultimo dense sat fortiter punctato, pedibus parum elongatis, sat gracilibus.* — Mozambique (ma collection).

Ressemble au *D. variolosus* Guér. (*pilicornis* Fairm.), mais plus large, avec le corselet moins grossièrement rugueux, l'écusson presque indistinct, les élytres plus larges, plus courtes, plus arrondies latéralement, à épaules plus effacées, à surface couverte de

rides ondulées, assez larges, à ponctuation indistincte; la partie réfléchie inégale, à peine ponctué, et la côte externe légèrement festonnée, moins tranchante.

**Sepidium Pagesii.** — Long. 19 mill. — *Oblongum, convexum, indumento luto, ad prothoracis latera dilutiore, elytris magis griscentibus, costis piceis, punctis et impressionibus externis piceis; capite inter antennas transversim impresso, antennis sat validis, prothoracis basin paulo superantibus, articulo 5° crassiore, asperulo, articulis ultimis infuscatis, prothorace medio carina obtusa piceola signato, postice utrinque transversim impresso, angulis lateralibus sat latis, obtusis, lobo dorsali antico lato crasso, inæquali, medio sulcatulo, antice subtruncato et medio breviter emarginato; elytris ovato-oblongis, disco costula irregulari valde sinuata, intus ramosa, interdum fere duplici, intervallis grosse inordinate punctatis, carina laterali fortiter transversum plicata, interstitiis profunde foveolatis, costis discoidalibus et externis ante apicem fere conjunctis, haud productis; subtus cum pedibus ferrugineo-lutosus.* — Abyssinie.

Cette belle espèce découverte par les Pères Lazaristes chez les Bogos, m'a été donnée par notre collègue M. Théry et communiquée par M. l'abbé David. Elle se rapproche, pour la forme générale et la coloration du *S. Kelleri* Fairm, mais sa protubérance du corselet rappelle celle du *S. cristatum* Fab.

**Clitobius strongyloides.** — Long. 5 mill. — *Breviter ovatus, postice leviter attenuatus, sat convexus, fusco-piceus, nitidulus; capite subtilissime punctulato, clypeo antice rufescente et parum emarginato, transversim sat fortiter impresso, ad latera profundius, antennis medium prothoracis superantibus, rufescentibus, articulis 5 ultimis paulo latioribus; prothorace amplo, elytris fere latiore, antice angustato, lateribus sat fortiter rotundato, dorso subtilissime dense punctulato, basi haud marginata, ante angulos vix sinuata, his fere rectis, parum productis; scutello brevissimo, obtuso, fere lævi, elytris ante medium postice leviter angustatis, dorso sat fortiter striatis, striis laxè punctulatis, intervallis vix convexiusculis, subtiliter dense punctulatis; subtus cum pedibus piceis, tibiis anticis extus medio dilatato-angulatis et dein crenulatis.* — Zambèze (ma collection).

Diffère des autres *Clitobius* par ses élytres atténuées en arrière presque dès la base, à stries bien marquées, et par les tibias antérieurs dont la tranche externe est angulée au milieu, puis finement denticulée et coupée obliquement vers l'extrémité.

**Coedius alternatus.** — Long. 5 mill. — *Ovatus, sat convexus, piceo-fuscus, opacus, setulis brevibus ferrugineo-griseis*



*vestitus*; capite subtiliter parce asperulo, antice sat late emarginato, lateribus utrinque obtuse rotundatis, antennis brevibus, apice longe clavatis; prothorace brevi, lato, elytris haud angustiore, lateribus fere rectis, ad angulos anticos tantum rotundatis, his obtuse rotundis, dorso dense subtiliter asperulo, margine postico medio late rotundato, sublobato, angulis fere obtuse rectis, scutello minutissimo; elytris ovatis, subtiliter striatis, intervallis subtiliter rugosulis, setulosis, vix convexiusculis, alternatim magis convexis, subtus cum pedibus piceus, nitidior, subtiliter rugosulus, tibiis anticis latis, fere triangularibus, extus obtuse tridentatis. — Sénégal (ma collection).

Ressemble assez au *coriaceus*, mais les élytres sont moins atténuées en arrière, les stries sont bien moins profondes, avec les intervalles à peine convexes, alternativement plus relevées, le corselet est plus court avec le bord postérieur presque anguleux au milieu et les tibias antérieurs sont plus larges.

**Cœdius latipes.** — Long. 3 mill. — *Præcedenti multo minor et prothoracis lateribus magis rotundatis, elytrorum interstriis æqualiter convexiusculis et anticis extus biangulatis distinguendus.* — Sénégal (ma collection).

Chez ces deux insectes, les petits soies ferrugineuses forment une série régulière sur le milieu des intervalles des stries.

**Eurynotus laminicollis.** — Long. 17 mill. — *Oblongus, niger, opacus, elytris paulo nitidulis; capite lævi, clypeo late ac profunde emarginato, genis ante oculos rotundatim ampliatis, antennis parum gracilibus, medium prothoracis paulo superantibus, articulis 2 primis brevibus, æqualibus, 5<sup>a</sup> longiore, quarto æquali, ultimis paulo brevioribus, prothorace elytris latiore, amplo, lateribus rotundatis, explanatis, margine leviter elevato, dorso lævi, obsolete impressiusculo, angulis anticis latis, productis, posticis latioribus, paulo obtusis, postice productis; scutello brevi, obtuse triangulari; elytris ovatis, basi plicatis, ad humeros dente obtuso armatis, sutura et utrinque costis 3 elevatis, 1<sup>a</sup> et 5<sup>a</sup> apice conjunctis duabus, externis acute carinatis, interstitiis biserialim foveolatis, parte epipleurali similiter carinata; subtus fere lævis, medio ferrugineo-pilosulus, abdomine subtiliter punctato, pedibus sat gracilibus, dense punctulatis.* — Abyssinie (ma collection).

Par la forme du corselet cet insecte rappelle l'*E. ruficornis* Germ., du Cap de Bonne Espérance: mais sa taille est bien plus forte, les élytres sont moins courtes et leurs carènes moins nombreuses, plus saillantes. Le faciès rappellerait plutôt le *Diastoleus collaris*, du Chili.

**Anomalipus granocostatus.** — Long. 19 mill. — *Ovatus*, parum convexus, fuscus, ferrugineo tinctus, opacus, granulis, costulis et lineolis elevatis denudatis, sat nitidis; capite fortiter punctato, antice profunde emarginato, fere bilobo, lobis rotundatis, vertice obsolete biimpresso, antennis validis medium prothoracis vix attingentibus punctatis, articulis ultimis sat transversis; prothorace transverso, basi elytris angustiore, medio valde dilatato-rotundato, lateribus basi breviter sinuatis, dorso densissime punctato, lateribus et basi rugosulo, lateribus deplanato, basi supra elytrorum basin producto, angulis posticis rectis; elytris brevibus, fere parallelis, apice fortiter declivibus et obtuse rotundatis, dorso utrinque costis 4 dense granulatis, 1<sup>a</sup> integra, 2<sup>a</sup>-5<sup>a</sup>que basi abbreviatis, laterali carinata, basi fortius acuta, interstitiis linea granulata subcostulatis, sutura similiter granulata, intervallis granulis laxè sparsutis, epipleuris latis, parum dense granatis; subtilus paulo nitidior, prosterno utrinque sat late sulcato, apice fere cochleato, abdomine asperulo-punctato, medio fere lævi, segmento 1<sup>o</sup> medio convexo et obtuse producto, pedibus fortiter rugoso-punctatis, tibiis anticis extus parum fortiter bidentatis; ♂. — Mozambique.

Ressemble assez au *dentipes*, mais bien plus petit, bien moins convexe, avec le corselet plus aplani sur les côtés qui sont plus fortement redressés à la base, et couvert d'une ponctuation ruguleuse extrêmement serrée; les élytres ont des côtés très granuleuses, avec une fine rangée de granules dans les interstices, la côte externe est carénée, fortement tranchante à la base.

**Peltoides quadriguttatus.** — Long. 5 mill. — *Orato-oblongus*, modice convexus, nigro-fuscus, nitidus, elytris utrinque maculis 2 obscure sanguineis, rotundatis ornatis; capite sat parvo, dense punctato, antice late arcuato, fronte late depressa, antice arcuatim impresso, clypeo medio convexo et paulo leviori, antennis obscure ferrugineis, articulis 7 ultimis latioribus; prothorace brevi, a basi antice arcuatim angustato, dorso subtilissime punctulato, margine postico utrinque late sinuato et impresso, lateribus sat anguste marginatis; scutello fere lævi, obtuso, lateribus sat rotundato; elytris modice marginatis subtiliter punctulatis, obsolete striatulis; subtilus piceus, pedibus obscure ferrugineis. — Gabon (ma collection).

Forme des *Peltoides*, mais corps un peu plus étroit et un peu moins marginé, le front est un peu impressionné.

**Peltoides pustulosus.** — Long. 4 1/2 mill. — *Oratus*, postice leviter attenuatus, modice convexus, piceus, sat nitidus, antice, lateribus et apice paulo rufo-piceo, elytris utrinque maculis 2 rufis, sat magnis, 1<sup>a</sup> paulo obliqua, antennis pedibusque piceolo-rufis;

*capite subtilissime alutaceo, ante oculos impresso, sutura clypeali impressa, labro fere verticali, prothorace brevi, longitudine plus duplo latiore, antice angustato, dorso vix perspicue subtilissime punctulato, basi utrinque stria brevi sat fortiter impresso, lateribus anguste marginatis, margine postico utrinque sinuato et extus obliquato; scutello fere triangulari; elytris ante medium postice attenuatis, apice rotundatis, lateribus sat anguste, antice latius marginatis, dorso subtiliter lineato-punctatis. — Gabon (ma collection).*

De la taille des *quadriguttatus* et d'une coloration analogue, mais moins foncée; mais la forme est vraiment ovale, les élytres étant atténuées presque dès la base et moins fortement arrondies à l'extrémité, les intervalles des lignes de points sont lisses, la coloration est moins brillante.

**Taraxides luniferus.** — Long. 19 mill. — *T. sinuato* Fab. *forma et sculptura simillimus sed aliter coloratus; niger, nitidus, elytris utrinque ante medium annulo flavo-rufo, antice late aperto, scutellum approximante et humerum attingente, unde linea tenuis marginali ad apicem prolongata sed ante apicem intus late hamata; elytris paulo magis gibbosulis et distinctius lineato-punctatis, prothorace distinctius punctato, tibiis anticis vix sensim arcuatis. — Gabon (ma collection).*

Le corselet présente de chaque côté du disque, un point roux qui doit disparaître souvent.

Ressemble extrêmement au *T. pictus* Champ., de l'intérieur du Gabon, mais ce dernier est presque mat, la bande antérieure des élytres est semblable, mais la dernière est différente, en forme de V et l'extrémité est largement d'un marron pâle, et ces bandes ne se rejoignent pas le long du bord externe; en outre les tibias antérieurs sont assez fortement arqués chez le ♂.

**Menepphilus ornatipennis.** — Long. 12 mill. — *Oblongus, modice convexus, niger, nitidus, elytris vitta transversim recta, ante medium et vitta fortiter arcuata, post medium, stramineis, apice late rufis; capite densissime subtiliter punctulato, antice arcuatim impressiusculo, labro ferrugineo; antennis brevibus, medium prothoracis haud superantibus, articulis 5 ultimis latioribus, compressis, fuliginosis; prothorace lato, transverso, elytris parum angustiore, antice et basi aequaliter parum angustato, dorso densissime punctato, lateribus fortiter, basi fortius marginato, margine postico utrinque fortiter sinuato, angulis posticis sat acutis, anticis magis obtusis, basi ante angulos leviter impressa; scutello fere triangulari, lævi; elytris basi haud attenuatis, dorso lineato-punctatis, intervallis subtilissime coriaceis, humeris im-*

*pressis; subtus fere leviss, prosterno lateribus subtiliter asperulo et minus nitido, pectore lateribus punctulato, pedibus levibus, tibiis leviter asperato-punctatis, anticis vix arcuatis, tarsis subtus sat dense rufo-pilosis. — Gabon (ma collection).*

Le genre de coloration fait un peu ressembler cet insecte au *Taraxides luniferus*, mais la bande antérieure des élytres est très différente, tout à fait droite et transversale. Il se rapproche du *Menepphilus 4-plagiatus* de Zanzibar, mais la coloration est différente, le corselet plus grand, et les élytres n'ont que des points formant des lignes, non des stries.

**Lypros rugatulus.** — Long. 13 mill. — *Parum oblongus, postice haud ampliatus, sat convexus, fuscus, vix nitidulus, undique dense sat fortiter punctatus, punctis brevissime ferrugineo-setulosus; capite post oculos sat abrupte angustato, clypeo antice transversim impresso, antennis crassis, fortiter punctatis, sat hirtulis, articulo 5° sequenti dimidio longiore, ultimo ovato, apice fere rotundato, prothorace transverso, elytris fere dimidio angustiore, lateribus rotundato, postice vix angustiore, angulis posticis valde obtusis; scutello obtuse ogivali, dense punctato; elytris sat brevibus, ad humeros angulato-rotundatis, rugosulo-punctatis, obsoletissime lineatis; subtus nitidior, dense punctatus, epipleuris ante medium rapide angustatis; pectore lateribus rugoso, mesosterno leviter impresso, tarsis posterioribus articulo 1° duobus sequentibus fere longiore, penultimo subtus densissime villosus. — Rufisque : communiqué par notre collègue M. Tournier.*

Bien distinct par sa forme plus large, ses élytres plus courtes, offrant de très légères traces de lignes longitudinales, et par sa tête paraissant assez brusquement rétrécie derrière les yeux. Sa coloration est aussi plus terne que chez ses congénères.

**Aspidosternum purpurinum.** — Long. 19 mill. — *Oblongo-ovatum, postice ampliatus et gibbosus-convexus, caruleo-metallicum, nitidum, elytris purpurinis; capite grosse punctato, paulo rugoso, clypeo transversim fortiter sulcato, antennis validis, compressis, apicem versus latioribus, magis cayanais, articulo ultimo subtruncato, obscuriore; prothorace transverso, elytris fere dimidio angustiore, lateribus rotundato, angulis anticis valde obtusis, posticis minutissime dentiformibus, dorso fortiter ac irregulariter punctato, punctis ad latera plus minusve confluentibus, margine rugoso; scutello leviss, semirotundo-obtus; elytris ovatis, post medium ampliatis, apice obtusis, dorso dense ac grosse punctatis; subtus cærulescens, valde nitidum, metasterno et abdomine medio paulo virescenti-micantibus, segmento ultimo et pedibus magis cayanais, pectore medio leviss, lateribus anguste punctato, abdomine*



*lateribus subtiliter strigosulis, pedibus compressiusculis, femoribus apice subtus denticulo armatis.* — Mrogoro (ma collection).

Ressemble beaucoup à l'*A. virugineum*, de Mozambique, mais les élytres sont d'une belle couleur pourpre avec un léger reflet violacé sur les côtés; elles sont plus longues, moins fortement convexes, l'écusson est obtus, le chaperon a une forte impression transversale, les antennes sont d'un bleu intense, plus élargies vers l'extrémité.

#### GABONIA n. g.

*Corpus oblongum, subparallelum, caput sat latum, sutura clypeali sat profunda, clypeo sinuato. Antennæ validæ, basin prothoracis haud attingentes, articulo 5º sequenti haud sensim longiore, ultimo fere truncato. Prothorax elytris paulo angustior, subquadratus, lateribus fere parallelis, antice denticulatis, angulis omnibus productis. Scutellum transversum, obtusissime angulatum. Elytra substriato-punctata, pedes sat graciles, haud rugosi, inermes, tibiæ anticæ vix arcuatæ, tarsi subtus inermes.*

**Gabonia denticulatus.** — Long. 10 à 11 mill. — *Elongato-oblongus, subparallelus, fuscus, nitidus, pedibus rufo-piceis; capite subtiliter punctato; sutura clypeali valde impressa et utrinque profundiore; prothorace longitudine vix sensim latiore, basi haud angustato, lateribus anguste marginato, dorso sat subtiliter dense punctato, basi marginato; scutello subtiliter punctulato; elytris ad humeros sat angulatis, apice conjunctim rotundatis, dorso striato-punctatis, striis parum profundis et extus obsoletis, unde lateribus minus regulariter punctatis, intervallis fere planis, lævibus; subtus dense punctatus, pectore paulo rugosulo, abdomine æqualiter punctato.* — Congo.

Cet insecte est extrêmement voisin du genre *Prioscelides* Kolbe, Stett. entom. Zeitung, 1889, 128 : il en diffère par le corselet moins étroit, presque carré, non rétréci à la base, plus faiblement denté sur les côtés, les antennes un peu plus courtes, à 3<sup>e</sup> article pas plus long que le 4<sup>e</sup>, le dernier plus tronqué, la saillie intercoxale plus courte et les pattes bien moins robustes, à tibiais non denticulés, ni arqués, sauf les deux antérieurs qui sont faiblement courtes, et à tarses non épineux en dessous.

Le genre *Prioscelides* est assez voisin des *Prioscelis* : il s'en distingue par sa forme moins convexe, plus parallèle, les côtés du corselet fortement dentés, le 3<sup>e</sup> article des antennes plus long que le 4<sup>e</sup>, les tarses plus épineux en dessous, les tibiais arqués, surtout les antérieurs, et fortement denticulés en dedans, les

fémurs postérieurs ont aussi une forte dent aiguë en dessous, près de l'extrémité.

Le type de ce genre, *P. rugosus* Kolbe, l. c., a 20 mill. de longueur ; il est d'un brun noirâtre, peu brillant, presque mat ; la tête est rugueusement ponctuée avec la suture clypéale assez distincte, le chaperon est assez fortement sinué, les antennes sont robustes, les 2 derniers articles sont plus épais, surtout le 11<sup>e</sup> ; le corselet notablement plus étroit que les élytres, est à peine plus large que long, légèrement rétréci à la base et en avant avec les côtés un peu arqués, munis de 5 ou 6 dents médiocrement saillantes, l'antérieure, formant l'angle, plus marquée, la surface densément et ruguleusement ponctuée ; l'écusson est obtusément arrondi, rugueusement ponctué ; les élytres sont oblongues, presque parallèles, obtusément arrondies à l'extrémité, à côtes étroites, assez nombreuses, médiocrement saillantes, les intervalles marqués de gros points peu enfoncés accompagnés de fines granulations plus marquées à la base, le dessous du corps est rugueusement ponctué ainsi que les pattes, le métasternum est en outre striolé au milieu, les 4 premiers segments ventraux sont lisses et un peu convexes au milieu à l'extrémité ; les pattes sont robustes, avec les tibias denticulés en dedans.

**Micrantereus scaberrimus.** — Long. 23 mill. — *Ovatus, crassus, niger, parum nitidus; capite prothoraceque lævibus, hoc transverso, elytrorum medio valde angustiore, lateribus rotundato, anticis vix angustiore; scutello brevissime obtuso; elytris ovatis, postice angustatis et sat fortiter declivibus, granis sat nitidis, obtuse conicis dense instructis, basi utrinque granis 5 longitudinaliter connexis et costulam brevem efficientibus; subtilis cum pedibus nitidus, fere lævis, abdomine basi impresso et subtiliter striolato, pedibus magnis, validis, grosse punctatis, femoribus intus, tibiis apice intus et larsis subtilis rufo-pilosis, tibiis anterioribus medio late et obtuse angulatis, intermediis ante medium intus obtuse angulato-dilatatis, femoribus intermediis apice intus sat fortiter angulatis, posticis intus densius rufo-villosis*; ♀. — Mozambique (ma collection).

Ce bel insecte est le géant du genre ; comme forme il se rapproche du *femoratus*, et comme sculpture du *variolosus* ; mais les tubercules des élytres sont plus serrés, plus uniformes et bien vaguement rangés en séries longitudinales ; les pattes sont grandes et robustes, mais les fémurs n'atteignent pas l'extrémité des élytres et sont épais sans être renflés, et n'offrent pas de dents ni d'épines. Peut-être que le ♂ présentera des différences sous ce dernier rapport.

**Dysgena tenuicollis.** — Long. 13 à 15 mill. — *Elongata, modice convexa, fusca, nitidula, glabrata, subtus cum pedibus rufo-picea, abdomine interdum obscuriore; capite minuto, oculis sat magnis, dense punctato, antice rufescente et transversim profunde sulcato, antennis elongatis, articulo 5° quarto fere brevior, ultimis longioribus; prothorace parum transverso, elytris multo angustior, antice angustato, lateribus leviter arcuatis, dorso sat subtiliter densissime punctato, basi rufa, sat subtiliter marginata; scutello obtuse triangulari, rufescente; elytris elongatis, ad humeros angulatim rotundatis, postice leviter ampliatis, apice obtusis, dorso profunde striatis, intervallis convexis, dense transversim rugosulo-cicatricosis; subtus subtilissime coriacea, metapleuris subtiliter rugosulis, abdomine lateribus strigosulo et impressiusculo, pedibus dense punctatis.* — Abyssinie (ma collection, donnée par M. l'abbé David).

Ne diffère des autres *Dysgena* que par son corps glabre en dessus et sa forme plus svelte; le ♂ est un peu plus étroit que la ♀, avec les élytres moins amples. Les antennes du ♂ dépassent le milieu du corps, celles de la ♀ sont plus courtes.

**Nemostira rufitarsis.** — Long. 12 à 16 mill. — *Elongata, fusca, nitida, elytris metallicis, æneo-viridibus aut cærulescentibus et ad suturam leviter purpurascentibus, antennis (articulo 1° excepto) tarsisque rufo-testaceis; antennis gracilibus, glabris, articulo 2° tertio fere dimidio brevior, 3° quarto brevior, ultimo duobus præcedentibus conjunctis ♂ longior, ♀ æquali; prothorace suborato, antice et postice angustato, antice paulo magis, lateribus leviter arcuatis, ante basin paulo sinuatis, basi sat fortiter marginata, angulis paulo exsertis, dorso fortiter laxè punctato; elytris elongatis, fere parallelis, sat fortiter crenato-striatis, intervallis convexis, levibus; pedibus sat magnis; ♂ minor, oculis majoribus, magis approximatis, elytris magis parallelis, intervallis minus convexis, femoribus posticis crassioribus, tibiis intus medio denticulo sat acuto armatis; ♀ major, magis purpurascens, oculis minoribus, fronte latiore, punctis aliquot sparsuta, elytris magis amplis, fortius crenatis, intervallis magis elevatis, tibiis anticis rufo-testaceis, femoribus posticis ceteris vix crassioribus.* — Gabon (ma collection).

Ressemble assez à la *N. metallica* Fairm., de Madagascar, mais les yeux sont plus saillants, ce qui fait paraître la tête plus étranglée à la base, les antennes sont bien plus grêles et plus longues, les élytres sont plus fortement crénelées, le corselet est grossièrement ponctué, et les pattes postérieures sont plus courtes avec les fémurs bien moins épaissis.

**Nemostira rufovirens.** — Long. 14 mill. — Ressemble ex-

trêmement à la précédente, surtout au ♂, en diffère par les élytres moins étroites, d'un vert métallique un peu bronzé, le reste du corps d'un brun de poix, les antennes d'un roux un peu brunâtre, le corselet un peu plus long; tous les tarses sont bruns en dessus; les ♂ et ♀ sont de taille et de coloration semblables; chez les ♂ les pattes postérieures sont conformés comme chez la *rufitarsis*. — Old-Calabar (ma collection).

**Nemostira interstitialis.** — Long. 12 mill. — *Elongata, piceo-fusca, sat nitida, elytris cœruleis, metallicis; capite lævi, oculis parum approximatis, antennis parum gracilibus, rufo-testaceis, articulis 2 primis fuscis, parum hirsutulis; prothorace ovato, antice et postice fere similiter angustato, lateribus leviter arcuatis, ante basin sat fortiter sinuatis, basi marginata, angulis sat exsertis, dorso impunctato; elytris elongatis, subparallelis, crenulato-striatis, intervallis leviter convexis, 5<sup>e</sup> (basi excepta) foveolis impresso, ceteris alternatim foveolis raris postice signatis; subtus lævis, femoribus sat gracilibus; ♀.* — Cap de Bonne Espérance (ma collection).

Ressemble beaucoup à la *N. metallica* mais plus étroite, surtout pour le corselet, et remarquable par les petites fossettes que porte le 3<sup>e</sup> interstrie, les autres n'en ayant que 2 ou 3 vers l'extrémité.

**Horia Crouzeti.** — Long. 30 mill. — *Elongata, subparallela, rufo-testacea, nitida, genubus, tibiis tarsisque piceis; capite transverso, prothorace paulo angustiore, sat dense punctato, inter oculos transversim late ac leviter impresso, antennis (fractis) basi piceis; prothorace valde transverso, elytris haud angustiore, lateribus leviter rotundato, antice vix angustiore, dorso subtilissime laxè punctulato, basi marginato, ad angulos posticos fortiter impresso, his sat obtusis, anticis rotundatis; scutello obtuse ogivali, punctulato; elytris elongatis, parallalis, apice separatim rotundatis, dense punctulatis, sutura et utrinque costulis 3 parum elevatis, externa basi oblitérata, intervallis vage ramoso-nercosis; subtus subtilissime punctulata, segmentis 5 et 4 apice transversim leviter impressis, 5<sup>e</sup> apice late ac leviter truncato, pedibus brevibus.* — Abyssinie.

Le faciès de cet insecte rappelle plutôt celui des *Cissites* que celui des *Horia*, C'est une découverte intéressante, car ce dernier genre appartient surtout à l'Asie et nous la devons à Mgr. Crouzet, des Lazaristes.

Malheureusement l'unique individu est privé d'antennes et paraît une ♀. Il m'a été communiqué par M. l'abbé David.

**Zonitis gigantea.** — Long. 21 mill. — *Elongata, postice ampliata, rufa, capite prothoraceque nitidis, elytris subopacis.*



*subtus piceolo-rufa, nitida, tibiis tarsisque infuscat, antennis cum palpis similiter infuscat, illis articulo 1<sup>o</sup> rufo; capite breviter ovato, postice utrinque rotundatim angulato, dense sat subtiliter punctato, clypeo antice transversim sulcato, labro sat longo, apice leviter sinuato, oculis parum approximatis, antennis sat gracilibus, corporis medium paulo superantibus, articulo 2<sup>o</sup> primo aequali; tertio vix brevior, ceteris subæqualibus; prothorace elytris valde angustior, latitudine haud longior, medio vix sensim ampliato, antice sat fortiter angustato, dorso subtiliter sat dense punctulato, disco medio obsolete triimpresso, basi marginato, angulis fere rectis; scutello triangulari-truncato, subtilissime punctato; elytris ad humeros subangulatim rotundatis; a medio postice ampliatis, apice late rotundatis, densissime ac subtilissime granulato-punctulatis, sutura et utrinque lineis 3 tenuissime elevatis; postice oblitteratis, subtus similiter granuloso-punctulatis, abdomine lateribus impresso. — Haut Congo (ma collection).*

Ce *Zonitis* est le plus grand de tous ceux que je connais; il se rapproche du *nigripes* Wat., de Madagascar, mais il est plus grand, la coloration est différente, les élytres sont plus longues et plus finement ruguleuses, et le 2<sup>e</sup> article des antennes est égal au 1<sup>er</sup>, à peine plus court que le 3<sup>e</sup>.

**Eumimetes turchais.** — Long. 15 mill. — *Oblongus, postice leviter attenuatus, modice convexus, fuscus, sed indumento pubescente dilute virescenti-cærulescente dense vestitus, antennis denuclatis, articulis 3-11 basi exceptis; capite antice planato, subtiliter punctis fuscis sparsuto, striola tenui medio longitudinaliter signato, occipite macula transversa denudata fusca signato, antennis corpore paulo longioribus, articulo 1<sup>o</sup> apice breviter cærulescente; prothorace brevi, elytris valde angustior, antice angustato, punctis fuscis pubescentibus parum densatis ornato, antice et postice transversim fortiter sulcato, parte basali et parte antica haud punctatis, lateribus ante medium dente sat valido armatis; scutello truncato, medio infuscat; elytris punctis fuscis sat dense impressis, punctis basi paulo majoribus, intervallis basi paulo rugosulis, humeris tuberculo polito fusco ornatis; subtus unicolor, segmento ventrali ultimo basi fusco, femoribus tibiisque supra fusco vittulatis. — Gabon (ma collection).*

Espèce fort remarquable par sa vestiture; la ponctuation des élytres rappelle celle de l'*E. fulvovestitus* Fairm., des Comores.

**Stenobia Pradierii** Lacord. — Long. 25 mill. — *Elongata, valde convexa, lateribus subcompressa, fusca, indumento fuliginoso vestita, opaca, prothorace vittulis 5 griseis parum distinctis, elytris plaga magna marginali, ante apicem evanescente magis brunnea,*

*interdum parum distincta ornatis; capite rugosulo medio sulcato, tuberculis antennariis intus angulatis, antennis basi, subtus fasciculatis, articulo 1° medio inflato, nodoso, basi angustato, apice transversim bistriato, et extus dente conico sat valido armato, articulo 5° paulo inæquali et levissime arcuato; prothorace parum transverso elytris angustiore, antice transversim impresso, lateribus dente oblique conico et disco tuberculis 5 (••) obtusis signato, postice medio tenuiter canaliculato, lateribus inæqualibus; elytris pone humeros obliquatis et paulatim attenuatis, ante medium late transversim paulo depressis, post medium declivibus, basi utrinque lineis 2 brevibus grosse tuberculatis signatis, intervallis granulis minutis sparsutis, dorso paulo inæqualibus, laxè punctulatis, lateribus medio compressis, apice late truncatis et utrinque bidentatis, dente suturali obtuso, externo breviter spinoso; subtus subtiliter pubescens, abdomine nitido, lateribus puberulis, pedibus validis, tibiis 4 posticis medio obtuse angulatis, basi late sinuatis. — Gabon.*

Les élytres sont relevées à la base, déprimées avant le milieu, puis assez fortement relevées et déclives jusqu'à l'extrémité. Quand cet insecte n'est pas frais, la tache marginale des élytres est presque indistincte ainsi que les bandes du corselet.

La description de Lacordaire étant courte, j'ai pensé qu'il serait utile de la compléter.

**Belodera affinis.** — Long. 12 à 15 mill. — B. apicali Fairm. *valde similis, similiter colorata, sed major, capite summo strigis 5 brunneis, lateralibus brevibus, mediana in sulco impressa, antennis griseis, sat longe ciliatis, articulo 1° medio late picco, 5° apice picescente, ceteris piccolis, basi griseis; 5° haud arcuato, quarto fere æquali, prothorace basi haud abrupte angustato, dorso laxè ac subtiliter asperulo, lateribus anguste infuscato, disco tuberculis 5 (••) minutissimis et ad marginem anticum granulis 2 approximatis brunneis, scutello medio fusco, elytris ad humeros angulatis, subparallelis, ante apicem tantum angustatis, apice subtruncato-rotundatis, longius pilosis, dorso laxè, postice obsolete punctato, costulis vix elevatis, maculis minutis obscurioribus sparsutis; subtus cinerascens, punctis piceis sparsuta, abdomine medio haud penicillato, segmento 5° apice sat fortiter emarginato, femoribus tibiisque piceolo fere biannulatis, tibiis posterioribus sat dense ciliatis. — Abyssinie, Alitiéna (ma collection).*

Le petit individu, très frotté, montre les tubercules dorsaux du corselet bien plus développés; les antérieurs, produits par une pubescence serrée, sont effacés; les côtes des élytres sont de même bien plus marqués ainsi que la ponctuation, et leur extrémité,

garnie d'assez longs poils, est bien plus arrondie; le 5<sup>e</sup> segment ventral est largement impressionné en arc. C'est probablement une ♀.

PAPHRÆCIA n. g.

*Corpus elongatum. Caput verticale, fronte quadrata, oculi verticales, supra valde angustati et abbreviati, infra oblongi. Antennæ nudæ corpore longiores, articulo 1<sup>o</sup> elongato, subfusiformi, prothoracis medium attingente, 2<sup>o</sup> brevissimo, 5<sup>o</sup> brevi, quarto dimidio brevior. Palpi breves, graciles, articulo ultimo apice attenuato. Prothorax cylindricus, quadratus, inermis, elytris angustior. Scutellum apice rotundatum. Elytra apice oblique truncata, ad humeros angulata. Prosternum modice latum, acetabula antica clausa, intermedia breviter ac anguste aperta, coxæ anticæ globosæ, processus intercoxalis triangularis, sat acutus, segmentum ventrale primum secundo fere duplo longius. Pedes mediocres, femora paulo claviformia, tarsi crassiusculi, subtus dense villosi, anteriores articulo 1<sup>o</sup> paulo crassiore.*

Ce genre paraît voisin des *Belodera* dont il diffère par le corps simplement pubescent, non hérissé de poils, les antennes nues, à 3<sup>e</sup> article très court, le 2<sup>e</sup> paraissant soudé avec lui, le corselet à côtés droits, sans dents latérales et les cavités cotyloïdes intermédiaires très étroitement ouvertes. Les tibias intermédiaires ont un faible sillon.

**Paphræcia obliquepicta.** — Long. 9 mill. — *Elongata, postice leviter attenuata, piceola, indumento squalide cinerascens vestita, elytris plaga laterali, antice et postice angustata picea, postice fasciis 2 obliquis, ultima apicali, piceis, his fasciis cinereo-guttulatis, elytrorum basi et ad suturam nebulosis; capite prothorace haud latiore, parce punctato, inter antennis vix depresso, medio subtiliter sulcatulo, antennis basi sat approximatis, articulo 1<sup>o</sup> sat crasso, elongato, apicem versus gracilioribus, articulis 5-10 apice piceolis, prothorace quadrato, lateribus fere rectis, dorso basi transversim obsolete impresso; elytris parce punctatis, sutura paulo elevata, utrinque costula parum indicata; subtus magis grisea, segmento ultimo longiore, apice emarginato.* — Abyssinie (Raffray, ma collection).

La forme et la coloration des élytres rappellent la *Tigrana lateritia* Fairm., de Madagascar.

**Cymatura lichenifera.** — Long. 82 mill. — *Elongata, subparallela, piceo-fusca, pube ferruginea et piceola vermiculato-variegata, elytris cristulis pilosulis piceis et fuliginosis irregulariter reticulatis; capite convexo, parce punctato, medio sulcato;*

*antennis corpore parum brevioribus, articulo 1° crasso et 3° pilis rubiginosis et piceis maculosis, ceteris basi longe et apice breviter pallidis; prothorace haud transverso, elytris valde angustiore, dorso fortiter sat dense punctato, antice et basi multo minus, disco tuberculis 2 sat minutis breviter fusco-penicillatis munito, antice transversim sat late depresso, lateribus dente valido, basi lato, apice lævi, obtuso armatis, scutello dense rufo-piloso; elytris elongatis, subparallelis, postice vix angustatis, apice fere truncatis, punctis sat grossis irregulariter parum dense impressis, lateribus brevissime penicillatis, apice fuscis et setulis nigris densatis terminatis; subtus nitidior, cum pedibus picea, pilis rubiginosis adpressis maculosa, abdomine punctis denudatis sparsuto. — Mozambique.*

Ressemble à la *C. mucorea* Fairm., mais beaucoup plus grande, les tubercules antennifères sont bien moins saillants, le corselet n'est pas carené au milieu, les dents latérales sont bien plus saillantes, la vestiture des élytres est presque la même, mais les larges bandes transversales n'existent pas et leur emplacement n'est indiqué que par un court réseau plus pâle.

**Nitocris luteiceps.** — Long. 13 mill. — *Elongata, gracilis, elytris medio longe leviter angustatis, nigra, nitidula, capite, prothoracis margine antico et antennarum articulo 1° flavo-luteis; capite sat magno, parce punctulato, inter antennis stria tenui longitudinaliter impresso, antennis gracilibus, corpore haud longioribus, articulo 1° apice fusco leviter tincto, articulis ultimis ferrugineis; prothorace subquadrato, latitudine haud longiore, dorso punctis raris sparsuto, antice utrinque leviter, postice transversim sat fortiter impresso, basi leviter angustato; scutello triangulari, elytris elongatis, ad humeros angulatis, medio longe leviter angustatis, ante apicem dilatatis, apice oblique truncatis et extus acute unispinosi, dorso sat fortiter sat dense punctatis, sutura et utrinque costulis 2 leviter elevatis; abdomine subtiliter pruinoso et leviter pilosulo. — Gabon (donné par M. Nadar).*

Cet insecte ressemble à certaines *Oberea*, mais la forme des élytres ne permet pas la confusion. La tête est remarquable par la longueur du vertex.

**Nitocris humilis.** — Long. 12 mill. — *Elongata, filiformis, elytris medio vix angustatis, rufa, nitidula, elytris (basi excepta) antennisque fuscis, tibiis posticis infuscatis; capite subtiliter punctulato, antice evidentius, inter antennis, leviter depresso, his gracilibus, corpore haud longioribus, apice obscure ferrugineis; prothorace quadrato, latitudine vix longiore, punctis raris*



*sparsuto, antice et postice transversim, lateribus breviter ac longitudinaliter impresso; scutello medio convexo, apice obtuso; elytris ad humeros fere recte angulatis, medio leviter longe angustatis, ante apicem dilatatis, apice utrinque oblique truncatis et acute bidentatis, dorso sat fortiter punctatis, sutura paulo elevata, regione suturali basali leviter oblonge impressa et rufo-pubescente* — Gabon (donné par M<sup>r</sup> Nadar).

Forme de la précédente, mais plus petite et plus grêle; les élytres ont la base rousse comme le corselet, cette couleur ne dépasse guère le 5<sup>e</sup> de la longueur et se fond avec le reste; elles ont en outre une légère dépression pubescente à la base de la suture et n'ont pas de côtes; le 1<sup>er</sup> article des antennes est un peu plus échancré en dessous et la tête est bien plus courte. Ressemble à *N. Pascoei* pour la coloration, mais bien plus petite, grêle, sans côtes sur les élytres et avec des antennes bien plus grêles.

**Syagrus fusco-æneus.** — Long. 5 1/2 mill. — *Oblongus, convexus, fusco-ænescens, nitidus, glaber, pedibus piceis, antennis rufo-piceis, basi dilutis; capite fortiter punctato; prothorace parum transverso, elytris paulo angustiore, antice sat fortiter angustato, lateribus postice fere parallelis, antice tantum arcuatis, dorso dense punctulato; scutello obtuso, lævi; elytris oblongis, ad humeros sat rotundatis, subparallelis, apice rotundatis, dorso striatulo-punctatis, punctis sat grossis, intervallis lævibus, vix convexiusculis, callo humerali polito; femoribus subtus vix sensim angulatis, tibiis sulcatulis, intermediis extus ante apicem sinuatis et setosulis, tibiis posticis apice sat acute dentatis.* — Sénégal (coll. Oberthur).

Se rapproche assez du *S. calcaratus* Fab. pour la forme, mais la coloration est différente, le corselet plus large, les élytres sont presque striées, les fémurs sont bien moins épais, inermes, les tibias intermédiaires sont moins fortement sinués avant l'extrémité.

**Syagrus cinerascens.** — Long. 4 mill. — *Oblongus, subcylindricus, piceo-ænescens, pube cinerea squamulosa dense vestitus, antennis pedibusque rufo-testaceis; capite dense punctato, oculis prominulis; prothorace parum transverso, elytris paulo angustiore, lateribus vix arcuatis, basi breviter parum angustato, antice longius attenuato, dorso dense subtiliter punctato; scutello obtuso, punctulato, pubescente; elytris ad humeros paulo rotundatim angulatis, post medium leviter attenuatis, dorso densissime punctatis, callo humerali sat convexo; subtus obscurus, cum pedibus similiter pubescens, femoribus crassis.* — Sénégal, Rufisque (coll. Oberthur).

Ressemble au *Pachnychorus holosericeus*, du même pays.

**Polysticta semirufa.** — Long. 7 à 8 mill. — *Breviter ovalis, rufa, nitida, elytris brunneis, utrinque maculis 5 flavis, magnis, macula humerali angusta, rufescente et per marginem usque ad apicem anguste prolongata; capite brevi, ad oculos punctulato, clypeo sat fortiter arcuatim impresso; antennis basin prothoracis haud attingentibus, articulis 5 ultimis crassioribus, interdum apice fumatis, prothorace brevi, elytris angustiore, fere lævi; elytris semiglobosis, lineato-punctatis, lineis interdum fere obsoletis, interdum basi paululum impressiusculis, intervallis lævibus; subtus lævis.* — Mozambique (coll. Oberthur).

Très voisine de *P. Clarkii*, mais moins renflée, la couleur générale d'un roux assez clair avec les élytres brunes, à taches jaunes moins rondes, une tache humérale prolongée le long du bord externe jusqu'à l'extrémité; les lignes de points sont bien plus fines.

---